

# პრეპარატ **კამელინის** გამოყენება დამწვრობითი პაციენტების მკურნალობაში

დამწვრობის ცენტრი. კლინიკის  
ხელმძღვანელი პროფესორი  
ბესიკ იაშვილი

# კამელონი – იმუნომოდულატორი, ანტიოქსიდანტი

ქართული წარმოების ორიგინალური, განსაკუთრებული  
სახეობის თაფლისაგან დამზადებული სამკურნალო  
პროფილაქტიკური საშვალება. შეიცავს ფუტკრის  
ცხოველმოქმედების ბიოლოგიურად აქტიურ  
ნივთიერებებს: ცილებს, ამინომჟავებს, პეპტიდებს,  
აღდგჰიდებს, ფურფუროლს, ჭიანჭველამჟავას,  
მიკროელემენტებს.

ჩვენებები: დამწვრობა, კანის, რბილი, ქსოვილების  
ჩირქოვანი და ხანგრძლივი შეუხორცებელი  
ჭრილობები, ტროფიკული წყლულები, ფურუნკული,  
პანარიციუმი, ნაწოლები.


## კამელინის შეყვანა ორგანიზმში

```
graph TD; A[კამელინის შეყვანა  
ორგანიზმში] --> B[იმუნური სისტემის  
აქტივაცია]; A --> C[პირდაპირი ციტოტოქსიური  
მოქმედება ინფექციის  
გამომწვევ აგენტზე და  
სიმსივნურ უჯრედებზე]; A --> D[რეპარაციული  
პროცესების აქტივაცია  
კოლაგენის წარმოქმნის  
გაძლიერებით];
```

იმუნური სისტემის  
აქტივაცია

პირდაპირი ციტოტოქსიური  
მოქმედება ინფექციის  
გამომწვევ აგენტზე და  
სიმსივნურ უჯრედებზე

რეპარაციული  
პროცესების აქტივაცია  
კოლაგენის წარმოქმნის  
გაძლიერებით





პაციენტი 9 წლის  
სხეულის თერმული  
დამწვრობა  
8% /II – III ა ხარისხი



პაციენტი 15 წლის  
სხეულის თერმული  
დამწვრობა  
10% /II – III a ხარისხი



პაციენტი 14 წლის  
სხეულის თერმული  
დამწვრობა  
15% /II – III a ხარისხი

| მკურნალობის შეფასება                                                  | I-ჯგუფი<br>40 | II-ჯგუფი<br>26 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| ოპერაციული მკურნალობის<br>საშუალო ვადა ტრამვის<br>მომენტიდან (დღე)    | 18            | 23,2           |
| ოპერაციული მკურნალობის<br>საშუალო ვადა კლინიკაში<br>შემოსვლიდან (დღე) | 16,1          | 21,4           |
| ოპერაციის შემდგომ კანის<br>მთლიანობის აღდგენის<br>საშუალო ვადა (დღე)  | 14,2          | 18,6           |
| ტრანსპლანტანტის ღიზისის<br>სიხშირე                                    | 3,8           | 16,2           |

პაციენტი 47 წლის სხეულის ელ-კონტაქტური  
დაზიანება დამწვრობითი შოკი  
45% (25%) IIIa - IIIb - IV



პირველადი  
აუტოდერმოპლასტიკა  
პაციენტი 21 wlis sxeulis Termuli  
დამწვრობა 45% (18%) II – IIIa - IIIb



პირველადი  
აუტოდერმოპლასტიკა  
პაციენტი 42 წლის სხეულის თერმული  
დამწვრობა 10% (3%) II – IIIa - IIIb



# პირველადი

## აუტოდერმოპლასტიკა

პაციენტი 18 წლის სხეულის კონტაქტური  
თერმული

დამწვრობა 0,5% IIIბ



# პაციენტი 25წლის გართულებული.გახსნილი ჭრილობა



# პაციენტი 58წლის სხეულის ელ- კონტაქტური დაზიანება



გმადლობთ ყურადღებისათვის