

კლინიკური კვლევა:
“პოპულარული კამელინ ფლუს
გამოყენება ყელის
ინფექციური დაავადებების
მკურნალობაში

მარინა შიხაშვილი
შპს ქ. თბილისის საოჯახო მედიცინის სასწავლო
კლინიკური ცენტრი
2011 წელი

კამელინ ფლუ

- ▶ ანთების საწინააღმდეგო
- ▶ ტკივილგამაყუჩებელი
- ▶ ანტიბაქტერიული
- ▶ ანტივირუსული
- ▶ სოკოვანი ინფექციების საწინააღმდეგო
მოქმედება

კვლევის მიზანი:

- ▶ კამელინ ფლუს გამოყენებით პირის ღრუს და ყელის ინფექციური დაავადებების მკურნალობის ეფექტურობისა და უსაფრთხოების შეფასება.

კლინიკური კვლევის ფაზა:

- ▶ კლინიკური კვლევა მიმდინარეობდა პრეპარატის კლინიკური კვლევის III ფაზაში.

ეთიპური მხარე

- ▶ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წამლის სააგენტოს სანებართვი მოწმობა № კ/კ/კ - 000084.
- ▶ თითოეული პაციენტისგან მიღებული ინფორმირებული თანხმობა

კვლევის ბანხორციელების აღმარა:

- ▶ კვლევისათვის შერჩეულ იქნა 25 პაციენტი
- ▶ ექსპერიმენტულ ჯგუფში - 15 პაციენტი
- ▶ საკონტროლო ჯგუფში – 10 პაციენტი
- ▶ დიაგნოზი - მწვავე ფარინგიტი ან ტონილიტი
- ▶ ორივე ჯგუფში მონაწილეობდა 18 წლის ზემოთ ასაკის
 - 16 ქალი
 - 9 მამაკაცი

კვლევის განხორციელების აღმართა:

- ორივე ჯგუფში მკურნალობა მიმდინარეობდა სტანდარტულად
 - შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული “რესპირატორული ინფექციების მართვის” გაიდლაინის მიხედვით.
- მკურნალობის კურსი - 5-7 დღე
- ექსპერიმენტულ ჯგუფში პაციენტებს სტანდარტულ მკურნალობაზე დამატებული ჰქონდა კამელინ-ფლუ 4 გაფრქვევა დღეში 3-6-ჯერ.

ლაპორატორიული და დიაბნოსტიკური პროცედურები

- ▶ კვლევაში ჩართული პაციენტები ამ დიაგნოზით დამატებით ლაბორატორიულ და დიაგნოსტიკურ პროცედურების ჩატარებას არ საჭიროებენ

კვლევაში ჩართვის პრიტერიუმები:

- ▶ 18 წლის ზემოთ ორივე სქესის პაციენტები, დიაგნოზით მწვავე ფარინგიტი ან მწვავე ტონზილიტი
- ▶ თითოეული პაციენტიდან მიღებულ იქნა ინფორმირებული თანხმობა, ისინი თანახმა იყვნენ შეესრულებინათ ექიმის ყველა მოთხოვნა.

კვლევიდან ამოღების პრიტერიუმები:

- ▶ პაციენტები, რომლებიც მონაწილეობდნენ
სხვა კვლევაში,
- ▶ ალკოჰოლიკები,
- ▶ ნარკოტიკების მომხმარებლები და
- ▶ ისეთი პირები, რომლებიც ფსიქიური
მდგრადმარეობის ან ადექვატურობის ხარისხის
გამო ვერ შეასრულებდნენ ექიმის მითითებებს.


კვლევაში მონაშილე პაციენტთა დაბებმილი რაოდენობა

- ▶ პაციენტთა საერთო რაოდენობა 25
ექსპერიმენტულ ჯგუფში 15
 - აქედან ფარინგიტი 8
 - ტონზილიტი 7
- ▶ საკონტროლო ჯგუფი - 10 პაციენტი

კაციენტთა ვიზიტების რაოდენობა და
კვლევის საერთო ხანგრძლივობა:

- ▶ პაციენტის ვიზიტი ექიმთან ხორციელდებოდა ორჯერადად
- ▶ ვიზიტების საერთო რაოდენობა 50
- ▶ კვლევის ხანგრძლივობა 45 დღე

ექსპერიმენტულ ჯგუფში პაციენტების სუბიექტური
შეგრძნებების გაუმჯობესება დაიწყო მკურნალობის:



დასკვნა

- ▶ კამელინ ფლუს გამოყენება ეფექტური და უსაფრთხოა პირის ღრუსა და ყელის ინფექციური დაავადებების მკურნალობაში
- ▶ აჩქარებს სიმტომების გაუმჯობესებას მე-2-3 დღიდან თვითშეგრძნებების დონეზე

გაადლობი ყურადღებისათვის